

Tabagisme passif



Coordonné par l’Institut Européen de la Santé des Femmes

www.eurohealth.ie/cancom/fr

LE TABAGISME PASSIF

Le tabagisme passif désigne l’inhalation de la fumée qui s’échappe dans l’air à partir d’une cigarette allumée. Il est causé par la seule présence d’un fumeur.

Les non-fumeurs sont exposés à de la fumée par personne interposée, c’est à dire à de la fumée non-filtrée qui s’échappe d’une cigarette qui brûle et qui inclut également la fumée exhalée par le fumeur.

La fumée par personne interposée contient la plupart des composants toxiques de la fumée que consomme le fumeur.

Risques du Tabagisme Passif pour la Santé

Les femmes qui fument ont des bébés qui pèsent moins que ceux des femmes qui ne fument pas.

On a découvert que les femmes qui fument ont un taux de fausse couche, de mortalité néo-natale, et de mort subite du nourrisson, plus élevé que les autres.

Les enfants de fumeurs ont des taux plus élevés de pneumonie, de bronchite, et d'autres maladies respiratoires. Ils ont aussi de plus grandes chances de développer le cancer du poumon plus tard dans leur vie.

Les adultes qui ne fument pas souffrent des conséquences de l'inhalation passive.

Les effets incluent:

- irritation des yeux, du nez et de la gorge;
- maux de tête, vertige et nausée;
- aggravation des allergies et de l'asthme;
- affaiblissement de la fonction pulmonaire.

[Cancom Index](#) | [Précédent](#) | [Suivant](#)

Copyright © 2000 -2016 European Institute of Women's Health
European Institute of Womens Health <http://www.eurohealth.ie/>

Vous êtes invités à distribuer et utiliser cette information sans altération.