

Cancro: Informazioni per le Donne
Istituto Europeo per la Salute delle Donne
www.eurohealth.ie

LE CURE CHE POTETE RICEVERE SE SOFFRITE DI CANCRO SONO:

Chirurgia

La chirurgia è un'opzione comune per molti dei cancri. Il limite della chirurgia dipenderà dalle dimensioni del cancro e da quanto può spargersi.
Per esempio nel cancro al seno può essere necessaria una lumpectomia o forse un mastectomia radicale se è ritenuta necessaria.
Ogni caso specifico è differente.

Chemioterapia

È un trattamento del cancro che usa farmaci per distruggere le cellule del cancro.

La quantità totale di farmaci deve essere abbastanza grande per uccidere le cellule cancerogene, ma non così tanto da distruggerne troppe di quelle sane.
Il trattamento che si riceve viene selezionato dal proprio medico, in base alle condizioni di salute.
È suddiviso solitamente in cicli.
Un ciclo può durare per due o tre settimane su un periodo di tre mesi. I farmaci possono essere presi oralmente (per via orale) o per via endovenosa (nella vena).
Gli effetti secondari della chemioterapia potrebbero essere nausea, perdita di appetito, perdita dei capelli, maggiore rischio di infezioni, perdite, anemia, stanchezza e cambiamenti nel ciclo mestruale. La maggior parte di questi effetti secondari si arrestano una volta che il trattamento cessa.
La chemioterapia egualmente è usata per ridurre il formato degli sviluppi cancerogeni, quindi minimizzano il limite di altri interventi quale la chirurgia.



Radiazione/Radioterapia

Questo trattamento del cancro usa l'alta radiazione di energia (raggi X) per distruggere le cellule del cancro danneggiando la loro capacità di dividersi. Per le donne con i cancri avanzati la radiazione può essere usata per contribuire a rendere il tumore più piccolo e più facilmente rimovibile dalla

chirurgia. Può anche contribuire ad alleviare il dolore causato dal cancro che si sparge nelle ossa.

Sono usati due tipi di radioterapia per trattare il cancro al seno:

1. Radioterapia Esterna

Per molto tempo è stata usata come sostegno alla chirurgia del cancro al seno - dopo una lumpectomia, una segmentectomia o una mastectomia.

La radiazione esterna del fascio può indurre la pelle della zona osservata ad essere bruciata, benchè questa si sbiadisca gradualmente in un look abbronzato.

2. Radioterapia Interna

Questo tipo di radioterapia a volte viene usata come sostegno dopo una lumpectomia o segmentectomia. Fornisce una radiazione supplementare alla zona intorno al tumore.

Per questo trattamento il soggetto viene sottoposto ad un'anestesia totale. Dei fili con un materiale radioattivo sono messi nei seni. La radioattività sparisce quando i fili vengono eliminati.

Gli effetti secondari possibili della radiazione/radioterapia includono:

- Arrossamento ed irritazione della pelle
- Nausea
- Stanchezza

Questi spariscono lentamente quando il vostro trattamento finisce, benchè possiate sentirvi stanchi anche per mesi.

Trattamento Ormonale

In alcuni casi può accadere che determinati livelli di determinati ormoni aiutano il cancro a svilupparsi. La terapia ormonale consiste nel cambiare i livelli di questi ormoni.

Questa terapia interessa l'intero corpo ed è usata con altri metodi. Quando viene effettuata la biopsia al seno le cellule vengono controllate per vedere se lo sviluppo è influenzato dagli ormoni dell'estrogeno e del progesterone, quindi serve a vedere se bisogna utilizzare un trattamento ormonale.

Copyright © 2000, 2011 Istituto Europeo per la Salute delle Donne

European Institute of Womens Health <http://www.eurohealth.ie/>

Siete invitati a distribuire ed usare queste informazioni senza alterazioni.