

## Proyecto de Comunicación sobre los Cánceres de la Mujer

Coordinado por el Instituto Europeo de Salud de la Mujer

### Información del cáncer cervical



El cáncer cervical se produce en el cuello del útero, que es la abertura a la matriz. La mayor incidencia de cáncer de cuello uterino se presenta en mujeres entre los 40 y los 55 años de edad. Cada año, en Irlanda mueren más de 60 mujeres por cáncer de cuello uterino. Casi el 70% de las mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino no han tenido pruebas de rutina de difamación. La mayoría de los casos de cáncer cervical se puede prevenir con éxito si se detecta a tiempo por la prueba de Papanicolaou regulares.

### SIGNOS Y SÍNTOMAS

- El síntoma más común es el sangrado vaginal después del coito.
- El sangrado entre períodos puede ser también anormal.
- Secreción vaginal ofensivo, puede ser un síntoma.

En la etapa temprana de la enfermedad, puede que no haya signos o síntomas evidentes de que le digan a una mujer que está en riesgo. La única manera de detectar células cancerosas es por medio de una citología periódica cada dos o tres años.

## **FACTORES DE RIESGO**

- La infección genital con el virus del papiloma humano (VPH), que en algunos casos, causa las verrugas genitales, juega un papel en el desarrollo del cáncer de cuello de útero. El VPH se transmite en las relaciones sexuales con una pareja infectada. Algunos consideran que el uso de preservativo y el diafragma puede ayudar a proporcionar protección en el cuello uterino de las influencias dañinas como el VPH.
- La actividad sexual en la adolescencia.
- Fumar
- El uso de anticonceptivos orales durante un largo tiempo.
- Múltiples parejas sexuales.

## **TRATAMIENTO**

1. El cáncer precoz se trata con láser. Esto cura el cáncer sin dañar el útero.
2. A veces el tratamiento puede implicar la extirpación quirúrgica del cuello del útero y del tejido circundante, pero deja los ovarios intactos. Esto dejará a la mujer tener hijos.

## **PREVENCION**

1. Hacerse una citología regularmente.
2. El uso de un anticonceptivo de barrera (preservativo o diafragma).
3. Renuncie al consumo de tabaco o reducir su consumo.

## **EL FROTIS CERVICAL PRUEBA / PAPANICOLAU PRUEBA**

La citología es una prueba sencilla que muestra si hay cambio en las células del cuello uterino que pueden convertirse en cáncer. Para tomar la muestra se usa un instrumento especial llamado espéculo que se introduce en la vagina. Esto ayuda a abrir la vagina por lo que la muestra puede ser tomada con más facilidad. El médico recogerá una muestra de células del cuello del útero con un pequeño cepillo o una espátula de madera pequeña. Esta muestra se coloca en un portaobjetos y se envía al laboratorio para ser estudiada minuciosamente. Los resultados se dan a su médico. El cáncer cervical no es potencialmente mortal si se detecta a tiempo. Esta es la razón de que los frotis cervicales regulares son tan importantes. Recuerde, la mayoría de las mujeres con un resultado de la prueba de frotis anormal no tiene cáncer de cuello uterino.

## **QUIEN SE DEBE HACER ESTE EXAMEN?**

Todas las mujeres que están o han estado sexualmente activas deben hacerse una prueba de citología al menos una vez cada tres años. Las mujeres deben hacerse su primera prueba a mediados de los 20 años. La enfermedad puede durar diez años hasta que se desarrolle, por ello se recomienda hacerse pruebas hasta los 65 años.

## **DONDE PUEDO HACERME UNA CITOLOGÍA?**

La prueba está disponible en médicos de familia, en hospitales de maternidad, planificación familiar y centros de bienestar de la mujer.

**UNA CITOLOGÍA PUEDE SALVAR TU VIDA!**

---

[Índice Cancom](#) | [Anterior](#) | [Siguiete](#)