

Proyecto de Comunicación sobre los Cánceres de la Mujer

Coordinado por el Instituto Europeo de Salud de la Mujer



Las [Trompas de Falopio](#) llevan los óvulos a la matriz. Son un par de conductos a ambos lados de la matriz

Los cánceres que empiezan en las trompas de falopio son poco comunes, tan solo hay alrededor de 1500 casos en todo el mundo. El cáncer normalmente se da en las trompas de falopio como resultado del esparcimiento desde otras partes (por ejemplo, los ovarios). Es más común en mujeres postmenopáusicas. Pero puede ocurrir también en mujeres más jóvenes.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Sangrado o secreción vaginal.
- Síntomas de presión.
- Incomodidad abdominal.
- Sangrado postmenopáusico.
- Estos síntomas de todas formas no son específicos del cáncer de las trompas de falopio.

TRATAMIENTO

Al ser difícil de identificar, normalmente se le descubre en un estado avanzado.

Si se descubre pronto, el tratamiento puede incluir [quimioterapia](#).

En mujeres pre-menopáusicas, la fertilidad normalmente se mantiene

Si se descubre tarde, el tratamiento incluirá [cirugía](#).

Esto puede requerir la eliminación de uno o ambos ovarios, junto con las trompas de Falopio. Una [histerectomía](#) también puede llevarse a cabo, esto es debido al hecho de que este tipo de cáncer, como un montón de otros, se puede propagar.

[Índice Cancom](#) | [Anterior](#) | [Siguiete](#)