


Proyecto de Comunicación sobre los Cánceres de la Mujer

Coordinado por el Instituto Europeo de Salud de la Mujer



Los ovarios son dos pequeñas glándulas productoras de huevos del tamaño de aceitunas. Están situadas a cada lado de la [matriz](#).

SIGNOS Y SÍNTOMAS

El cáncer de ovario no suele causar ningún síntoma perceptible. El dolor es un síntoma que rara vez se produce. Algunas señales de advertencia que se debe tener en cuenta son:

- Sangrado vaginal.
- Aumento repentino de peso o pérdida.
- Ciclos menstruales anormales.
- Un abdomen agrandado persistente. Esto es causado por una acumulación de líquido, una característica común de cáncer de ovario. La hinchazón que aparece y desaparece no está conectado al cáncer de ovario.

Si sospecha, el cáncer de ovario se detecta a menudo con un [examen pélvico](#). [El ultrasonido](#) también se puede utilizar en la detección de cáncer. Como no hay una prueba de detección para el cáncer de ovarios y los síntomas son tan vagos, muchas mujeres no son diagnosticadas con cáncer de ovario hasta que éste en sus etapas avanzadas. No hay causas conocidas de cáncer de ovario, aunque es más común en las mujeres sin hijos.

FACTORES DE RIESGO

- Al no tener hijos o una historia de infertilidad. Este factor de riesgo se refiere a que los ovarios han estado activos, ovulando cada mes sin el período de descanso que el embarazo da a los ovarios.
- Una historia familiar de cáncer de ovarios.
- Más de 40 años (Mayor riesgo a partir de los 60 años).
- Obesidad
- Las mujeres que ya han sido diagnosticados con cáncer de mama, intestinal o rectal.

Los siguientes factores parecen reducir el riesgo de cáncer de ovario, ya que ellos paran la ovulación (el proceso por el cual se libera el óvulo).

- Temprana edad de primer embarazo.
- Lactancia materna.
- Temprana menopausia.
- Uso de anticonceptivos orales.

Hay un claro beneficio de la píldora, la más larga es la mejor, y esto también se aplica al cáncer de endometrio.

TRATAMIENTO

La cirugía es el tratamiento normal para este tipo de cáncer. Esto puede implicar la eliminación de uno o ambos ovarios, el útero y las trompas de Falopio. Si el cáncer se detecta a tiempo, especialmente en mujeres más jóvenes, es posible que solo se elimine el ovario canceroso, y así la fertilidad puede mantenerse. La quimioterapia y la radioterapia también pueden utilizarse como tratamiento de seguimiento.

