


Cancer ovarien



Coordonné par l'Institut Européen de la Santé des Femmes
www.eurohealth.ie/cancom/fr



Les ovaires sont deux petites glandes de la taille d'une olive qui produisent les ovules. Ils sont situés de chaque côté de l'utérus.

SIGNES ET SYMPTÔMES

Le cancer ovarien ne cause souvent aucun symptôme apparent.

La douleur est très rarement un symptôme.

Quelques signes d'avertissement peuvent se remarquer :

- Saignement vaginal;
- Gain ou perte soudain de poids;
- Cycles menstruels anormaux;
- Un abdomen gonflé en permanence. Ceci est provoqué par une accumulation de fluide, ce qui se produit souvent avec le cancer

ovarien. Les gonflements temporaires ne sont pas liés au cancer ovarien.

Si on le suspecte, le cancer ovarien est souvent détecté lors d'un examen pelvien. Des ultrasons peuvent également être utilisés pour détecter ce cancer.

Comme il n'existe aucun dépistage pour le cancer ovarien et que ses symptômes sont imprécis, beaucoup de femmes ne sont pas diagnostiquées avant que le cancer ovarien ne soit à un stade avancé. Le cancer ovarien n'a aucune cause connue, bien qu'il soit plus commun chez les femmes n'ayant jamais eu d'enfants.

FACTEURS DE RISQUE

- N'avoir aucun enfant ou avoir une histoire d'infertilité. Ce facteur de risque est associé au fait que les ovaires ont produit des ovules chaque mois sans période de repos apportée par la grossesse.
- Des antécédents familiaux de cancer ovarien;
- Avoir plus de 40 ans (le plus grand risque se situe au-dessus de l'âge de 60 ans);
- Obésité;
- Femmes qui ont été déjà diagnostiquées pour un cancer du sein, intestinal ou rectal.

Les facteurs suivants semblent réduire le risque de cancer ovarien, car ils arrêtent tous l'ovulation (le processus par lequel l'ovule est libéré).

- Première grossesse tôt dans la vie;

- Allaitement;
- Ménopause précoce;
- Utilisation des contraceptifs oraux.

Prendre la pilule offre un avantage évident – plus l'utilisation est longue, plus l'avantage est renforcé – et ceci s'applique aussi au cancer de l'endomètre.

TRAITEMENT

La chirurgie est le traitement normal pour ce genre de cancer. Ceci peut comporter l'ablation d'un ou des deux ovaires, de l'utérus et des trompes utérines. Si le cancer est détecté tôt, particulièrement chez les jeunes femmes, il est possible de retirer seulement l'ovaire cancéreux, afin de préserver la fertilité.

La chimiothérapie et la radiothérapie peuvent également être utilisées comme traitements ultérieurs.

[Cancom Index](#) | [Précédent](#) | [Suivant](#)

Copyright © 2000 -2016 European Institute of Women's Health
European Institute of Womens Health <http://www.eurohealth.ie/>

Vous êtes invités à distribuer et utiliser cette information sans altération.