

Cancer des Trompes Utérines



Coordonné par l'Institut Européen de la Santé des Femmes

www.eurohealth.ie/cancom/fr

CANCER DES TROMPES UTÉRINES



La plupart des femmes affectées ont plus de 50 ans, mais il se fait plus commun chez les femmes de moins de 40 ans.

Les cas où le cancer part véritablement des trompes utérines sont très rares, il n'y en a eu que quelques 1 500 dans le monde entier.

D'habitude, le cancer atteint les trompes utérines à la suite d'un cancer qui a débuté ailleurs (par exemple, dans les ovaires).

Il est plus commun chez les femmes qui ont dépassé le cap de la ménopause, mais il peut se produire chez des femmes plus jeunes.

SIGNES ET SYMPTÔMES

- Saignement ou décharge vaginal;
- Sensations de pression;
- Malaise abdominal;
- Saignement après la ménopause;
- Cependant, ces symptômes ne sont pas spécifiques du cancer des trompes utérines.

TRAITEMENT

Difficile à détecter, ce cancer est souvent découvert à une étape ultérieure.

S'il est détecté tôt, il peut être traité par [chimiothérapie](#).

En principe, la fertilité des femmes qui n'ont pas encore atteint la ménopause n'en sera pas affectée.

S'il est détecté plus tard, le traitement aura recours à [la chirurgie](#). Il pourra y avoir ablation d'un ou des deux ovaires, ainsi que des trompes utérines. Une [hystérectomie](#) peut également être effectuée, car ce cancer, comme beaucoup d'autres, peut se répandre.

[Cancom Index](#) | [Précédent](#) | [Suivant](#)

Copyright © 2000 -2016 European Institute of Women's Health
European Institute of Womens Health <http://www.eurohealth.ie/>

Vous êtes invités à distribuer et utiliser cette information sans altération.