


Cancro: informazioni per Le Donne

Coordinato dall'Istituto Europeo per la Salute delle Donne

www.eurohealth.ie

CANCRO ALLE TUBE DI FALLOPPIO



Le [tube di Falloppio](#) trasportano le uova all'utero.

Sono due condotti situati ai lati dell'utero.

È molto raro che il cancro nasca nelle tube di Falloppio, la probabilità è soltanto di un caso su 1500. Il cancro nelle tube di Falloppio si presenta solitamente come conseguenza di un cancro sviluppatosi in altre zone (per esempio nelle ovaie) che poi si è diffuso. È più comune nelle donne in menopausa, ma può accadere anche nelle donne più giovani.

SEGNI E SINTOMI

- Perdite vaginali.
- Sintomi di pressione.
- Disagio addominale.
- Perdite Postmenopausa.

Questi sintomi non sono specifici del cancro alle tuba di Falloppio.

TRATTAMENTO

Poichè è difficile da rilevare, è scoperto normalmente in ritardo.

Se si interviene immediatamente il trattamento può coinvolgere la [chemioterapia](#).

Nelle donne nel periodo pre-menopausa non porta a condizioni di infertilità.

Se si interviene quando è già in uno stato avanzato, il trattamento coinvolgerà la [chirurgia](#).

Ciò potrebbe portare alla rimozione di una o entrambe le ovaie, insieme alle Tube di Falloppio. Può anche essere

effettuata un'[isterectomia](#), questo è dovuto al fatto che questo cancro, come molti altri, può diffondersi.

Copyright © 2000, 2011 Istituto Europeo per la Salute delle Donne
European Institute of Women's Health: www.eurohealth.ie
Siete invitati a distribuire ed usare queste informazioni senza alterazioni.