


Cancro: Informazioni per le Donne
 Istituto Europeo per la Salute delle Donne
www.eurohealth.ie

CANCRO ALLE OVAIE



Le ovaie sono due piccole ghiandole che producono le uova, con una forma simile a quella delle olive.

Sono situate ai due lati dell'[utero](#).

SEGNI E SINTOMI

Il cancro alle ovaie non causa alcuni sintomi notevoli.

Il dolore è molto raro.

Alcuni segnali di pericolo che dovrete osservare sono:

- Perdite vaginali.
- Aumento o perdita improvvisa del peso.
- Cicli mestruali anormali.
- Un addome ingrandito. Questo è causato da un'accumulazione di liquido, una caratteristica comune del cancro delle ovaie. Il rigonfiamento che viene e va **non** è causato dal cancro alle ovaie.

Se avete qualche sospetto, il cancro alle ovaie viene rilevato attraverso un [esame pelvico](#). Anche l'[ultrasuono](#) può essere usato per rilevare la presenza di cancro.

Poiché non vi è un test preciso per verificare la presenza del cancro alle ovaie ed i sintomi sono molto vaghi, a molte donne non viene diagnosticato se non prima che raggiunga la fase più avanzata. Non ci sono cause conosciute per il cancro alle ovaie, anche se è più comune nelle donne che non hanno avuto figli naturali.

FATTORI DI RISCHIO

- Non avere bambini o una storia di sterilità. Questo fattore di rischio viene collegato al fatto che le ovaie sono sempre state attive, l'ovulazione si è presentata ogni mese, senza quel periodo di riposo che la gravidanza offre alle ovaie.
- Una caso in famiglia di cancro alle ovaie.

- Età superiore ai 40 anni (il rischio è più elevato sopra i 60 anni).
- Obesità.
- Donne nelle quali è stato diagnosticato un cancro intestinale, rettale o al seno.

I seguenti fattori sembrano ridurre il rischio di cancro alle ovaie, poichè arrestano l'ovulazione (il processo attraverso il quale l'uovo viene liberato).

- Prima gravidanza in età giovanile.
- Allattamento al seno.
- Menopausa in anticipo.
- L'uso di anticoncezionali orali.

Vi è un chiaro beneficio nell'uso della pillola - più a lungo si prende- e questo è valido anche per il cancro dell'endometrio.

TRATTAMENTI

La [chirurgia](#) è il trattamento usuale per questo genere di cancro.

Consiste nella rimozione di una o entrambe le ovaie, dell'utero e delle tube di Falloppio.

Se il cancro è rilevato presto, specialmente se la donna è giovane, è possibile rimuovere solo l'ovaia cancerogena, in modo che resti fertile. Successivamente possono essere usate la [chemioterapia](#) e le radiazioni.

[Contenuti](#) [Cancom](#) [Indietro](#)

Copyright © 2000, 2011 Istituto Europeo per la Salute delle Donne

European Institute of Womens Health <http://www.eurohealth.ie/>

Siete invitati a distribuire ed usare queste informazioni senza alterazioni.