



Engender Database extract

GEOGRAPHIC

Continent
Europe (EU)

Country
Sweden

BASIC DETAILS

Language
Swedish

Sector:

Health

Title (EN):

Depression during childbirth -
equitable further implementation

Abstract description (EN):

A project on how to approach depression during childbirth and how to detect post-partum depressive symptoms (PPDS). The aim of this project is to find ways on how this method can be developed to detect and provide support to new fathers. Using the "Edinburgh Postnatal Depression Scale" (EPDS) for detection of post-partum depressive symptoms (PPDS) can develop methods to detect and provide support to new fathers. The method is currently available to new mothers in child care but not for

fathers. The project is also expected to add knowledge of the presence of PPDS in expectant fathers in Stockholm County, and any associated use of parental leave, the season and some background factors. Between 10-15% of all women become depressed during the first six months after birth, and in recent years have shown that postnatal depression is also found among new fathers, although to a lesser extent. In a Danish study, the incidence 7 per cent. Although postpartum depression is more common in women, men who live with depressed women have up to 50 percent higher incidence of depression. Depressed dads are generally - compared with ditto mothers - more disruptive, irritable and aggressive and not so inclined to seek help. Signs of father depression can include fatigue, burnout, restlessness, frustration, irritation, aggression and acting out behavior, low stress threshold, sleep problems, anxiety, destructive thoughts, feelings of guilt, to work / train too much, and difficulties in everyday decisions.

Engender Database extract

These symptoms were measured in the study by Madsen and Juhl (2007) of Gotland Male Depression Scale (GMDS), which is a form specially developed for detecting male depression symptoms.

Title (Original Language): Depression i samband med förlossning - jämlik vidareimplementering

Abstract description (Original Language):

Hur metoden

”Depression i samband med förlossning” och formuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) för upptäckt av post partum-depressiva symtom (PPDS) kan utvecklas för att upptäcka och ge stöd till nyblivna pappor. För närvarande erbjuds metoden till nyblivna mammor inom barnhälsovården (BHV) men inte för pappor. Projektet förväntas också tillföra kunskap om förekomst av PPDS hos nyblivna fäder i Stockholms län samt eventuella samband uttag av föräldraledighet, årstid och vissa bakgrunds

faktorer. Mellan 10-15 % av alla kvinnor blir deprimerade under de sex första månaderna efter förlossningen, och på senare år har det framkommit att postnatal depression även förekommer bland nyblivna fäder, om än i lägre omfattning. I en dansk studie var förekomsten 7 procent. Även om post partum depression är vanligare hos kvinnor, har män som lever tillsammans med deprimerade kvinnor upp till 50 procents högre förekomst av depression. Deprimerade pappor är generellt - jämfört med dito mammor - mer utagerande, lättirriterade och aggressiva och inte så benägna att söka hjälp. Tecken på pappadepression kan vara trötthet, utbrändhet, rastlöshet, frustration, irritation, aggressivitet och utagerande beteende, låg stresströskel, sömnproblem, ångest, destruktiva tankar, skuld känslor, att jobba/träna för mycket, samt svårigheter att ta vardagliga beslut. Dessa symtom mättes i studien av Madsen och Juhl (2007) med Gotland Male Depression Scale (GMDS) som är ett formulär speciellt utvecklat för att upptäcka manliga depressionssymtom. Barnafödande är en sårbar period i livet, då en depression kan ge flera allvarliga konsekvenser för den drabbade föräldern, barnet och partnern. Detta område är mest utforskat avseende deprimerade mammor. Det tidiga samspelet mellan mor

och barn kan påverkas negativt, genom att en deprimerad mamma på grund av sina symtom kan ha svårare att tolka barnets signaler och behov, samt vara mer benägen att uppfatta barnet och föräldraskapet som besvärligt. Även pappors depressioner har en specifik och bestående skadlig effekt på barnens tidiga beteende och emotionella utveckling och pojkar verkar vara känsligare i detta avseende. Det är således troligt att även samspelet mellan fäder och barn påverkas av PPDS hos papporna.

Keywords:

postnatal depression, fathers, childhood, post-partum depres [

Free Comments:

There is no place in the database where I can tell if this is an ongoing, a finished or a promising up-coming project or not. It is also hard to tell about the bibliographic

Engender Database extract

information when this is a project/intervention/a good practice that hasn't been evaluated yet.

BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION

Data type: Conference proceeding

Year: 2011

Editor:

Edition:

ISBN/ISSN:

Issue:

URL:

Authors:

Lastname	Initial
Carlberg	M
Lindberg	L
Simon	F
Edhborg	M
Shalmashi	S
Berggren	M

ENGENDER EDITOR

Firstname: Anna

Lastname: Månnsdotter

Email: anna.mansdotter@ki.se

Institution: Dept of public health Sciences

InstitutionURL: ki.se